

โรคพิษสุนัขบ้า

อันตราย! แต่ป้องกันได้

โรคพิษสุนัขบ้า (Rabies) หรือโรคคอกลิ้นน้ำ เป็นโรคติดเชื้อในระบบประสาท จากสัตว์สู่คน เชื้อโรคพิษสุนัขบ้าไม่พบแค่สุนัขเท่านั้น แต่พบได้ในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมหลายชนิด เช่น สุนัข แมว วัว ลิง หนู กระต่าย เป็นต้น

ผู้ที่ป่วยเป็นโรคพิษสุนัขบ้าจะเสียชีวิตเกือบทุกราย เนื่องจากปัจจุบันยังไม่มี ยารักษา แต่ป้องกันได้โดยการฉีดวัคซีน

อาการหลังจากติดเชื้อพิษสุนัขบ้า

ระยะที่ 1

มีไข้ เบื่ออาหาร



ระยะที่ 2

มีอาการที่ทางประสาท คลุ้มคลั่ง



ระยะที่ 3

ภาวะหายใจล้มเหลว หัวใจหยุดเต้น โคม่า และเสียชีวิต



3 ขั้นตอนการป้องกันการติดเชื้อ

พาสัตว์เลี้ยงไปฉีดวัคซีน ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า



หลีกเลี่ยงไม่ให้ ถูกสัตว์กัด ทำร้าย



หลังโดนกัด รีบไปพบแพทย์ทันที เพื่อฉีดวัคซีนป้องกัน



กองสาธารณสุขท้องถิ่น

กองสาธารณสุขท้องถิ่น
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น



โรคพิษสุนัขบ้า



กลุ่มเสี่ยง

อายุต่ำกว่า ๑๕ ปี
ถูกกัด ข่วน
แล้วไม่ไปฉีดวัคซีน

การติดต่อ

ถูกสัตว์มีเชื้อ
กัด ข่วน เลียบาดแผล

อาการผู้ป่วย

เบื่ออาหารเจ็บคอ มีไข้ อ่อนเพลีย
กลัวลม กลืนลำบากกลืนน้ำ
คันรุนแรง บริเวณที่เคยถูกกัด อัมพาตตาย

ตัวอย่างโรคสัตว์เป็นโรคพิษสุนัขบ้า

ระยะแรก

- นิสัยเปลี่ยน ไร้ราแรง
- หงุดหงิด เก้งตัว
- หวาดระแวง
- นอนตามยาย

ระยะตื่นเต้น

- กระวนกระวาย
- กลืนไม่ลง
- แก้วนอน

ระยะอัมพาต

- น้ำลายไหล
- คางห้อยตก
- ลิ้นออก ตาย

เกิดจากเชื้อ เรบีสไวรัส (RABIES VIRUS) มีสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม เช่น สุนัข แมว วัว ควาย ลิง หมู หนู กระต่าย กระรอก ฯลฯ เป็นพาหะนำโรค

ผู้ติดเชื้อจนมีอาการ ตาย ๑๐๐%

คำแนะนำเมื่อถูกกัด - ข่วน-เลีย

ล้างแผลด้วยสบู่และน้ำสะอาด
หลาย ๆ ครั้ง

ใส่ยา เบตาดีน

กักหมา - แมว
เพื่อสังเกตอาการ ๑๐ วัน

หาหมอหากฉีดวัคซีนต้อง
มาตามนัดทุกครั้ง

*****คำแนะนำสำหรับผู้เลี้ยง*****

ฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าทุกปี

ออกนอกบ้านต้องใส่สายจูง

ฝึกให้ เชื่องฟังคำสั่ง

ทำหมัน คุมกำเนิด

อย่าเหยียบ **อย่าเหยียบ** **อย่าแยก** **อย่าหยิบ** **อย่ายุ่ง**

คาถา
๕
กันสุนัขกัด

ทำให้สุนัขโกรธ

หาง หวี ตัว ขา
ให้สุนัขตกใจ

สุนัขที่กัดกันด้วยมือ

เป่า

อาหารที่สุนัขกำลังกิน

กับสุนัขที่ไม่รู้จัก
หรือไม่มีเจ้าของ

กลุ่มงานป้องกันโรค กองสาธารณสุขท้องถิ่น