

อย่ารอให้ป่วย แล้วค่อยป้องกัน โรคคางทูม

อาการที่ควรไปพบแพทย์

แกำบวม มีไข้

สงสัยโรคคางทูม ให้รีบไปพบแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัย

3 พื้นที่เสี่ยงสูง

สถานศึกษา

ค่ายทหาร

เรือนจำ

มาตรการเมื่อพบผู้ป่วย

รายงานเข้าสู่ระบบ

แยกกักผู้ป่วยอย่างน้อย 5 วัน

ติดตามผู้สัมผัสใกล้ชิด 25 วัน

ประชาชนร่วมป้องกันได้

สวมหน้ากากอนามัย เมื่อมีอาการป่วย

ล้างมือสบู่เสมอ

หลีกเลี่ยง การใช้ของส่วนตัวร่วมกัน

งด กิจกรรมรวมกลุ่ม เมื่อมีอาการสงสัยโรค

วัคซีน MMR 2 เข็ม ป้องกันได้ถึง 86%

ฉีด 1 เข็ม: 72%

ฉีด 2 เข็ม: 86%

หมายเหตุ : ภูมิคุ้มกันอาจลดลงตามระยะเวลา

เด็กควรได้รับวัคซีนเข็มแรกตอนอายุ 9 เดือน และเข็มที่สองตอนอายุ 1 ปี 6 เดือน

*** สำหรับผู้ใหญ่ การได้รับวัคซีนรวมป้องกันโรคหัด-คางทูม-หัดเยอรมัน (MMR) สามารถจัดหาวัคซีนได้โดยมีค่าใช้จ่าย โดยติดต่อขอรับบริการที่สถานพยาบาลใกล้บ้าน

ข้อมูล ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2569

ที่มา : กองโรคติดต่อทั่วไป

DDC DDC

สายด่วน
กรมควบคุมโรค
1422